

Politique d'autosubstitution

RECOMMANDATION POSOLOGIQUES POUR LA TINZAPARINE					
Indication	Dose*		Préparation/volume à administrer		Remarques
Traitement de la TVP/EP	175 unités/kg, s.-c., toutes les 24 h Arrondie à la dose supérieure normalisée en ml				Il n'y a pas de dose maximale. Dose requise en fonction du poids corporel (approximativement 175 UI/kg). Dosage normalisé en fonction du poids (démarcations).
	de 31 à 36 kg	6 000 unités	0,3 ml	d'une seringue graduée de 8000 unités	
	de 37 à 42 kg	7 000 unités	0,35 ml	d'une seringue graduée de 8000 unités	
	de 43 à 48 kg	8 000 unités	0,4 ml	d'une seringue graduée de 8000 unités	
	de 49 à 53 kg	9 000 unités	0,45 ml	d'une seringue graduée de 10 000 unités	
	de 54 à 59 kg	10 000 unités	0,5 ml	d'une seringue graduée de 10 000 unités	
	de 60 à 65 kg	11 000 unités	0,55 ml	d'une seringue graduée de 12 000 unités	
	de 66 à 70 kg	12 000 unités	0,6 ml	d'une seringue graduée de 12 000 unités	
	de 71 à 76 kg	13 000 unités	0,65 ml	d'une seringue graduée de 14 000 unités	
	de 77 à 82 kg	14 000 unités	0,7 ml	d'une seringue graduée de 14 000 unités	
	de 83 à 88 kg	15 000 unités	0,75 ml	d'une seringue graduée de 16 000 unités	
	de 89 à 93 kg	16 000 unités	0,8 ml	d'une seringue graduée de 16 000 unités	
	de 94 à 99 kg	17 000 unités	0,85 ml	d'une seringue graduée de 18 000 unités	
	de 100 à 105 kg	18 000 unités	0,9 ml	d'une seringue graduée de 18 000 unités	
Prophylaxie de la TEV	3 500 unités, s.-c., toutes les 24 h (Patients de moins de 40 kg)		Seringue préremplie de 3 500 unités		Dose requise en fonction du poids corporel (approximativement 75 UI/kg). Dosage normalisé en fonction du poids (démarcations).
	4 500 unités, s.-c., toutes les 24 h (Patients de 40 à 100 kg)		Seringue préremplie de 4 500 unités		
	8 000 unités, s.-c., toutes les 24 h (Patients de 101 à 120 kg)		Seringue préremplie de 8 000 unités		
	10 000 unités, s.-c., toutes les 24 h (Patients de 121 à 140 kg)		Seringue préremplie de 10 000 unités		
	12 000 unités, s.-c., toutes les 24 h (Patients de 141 à 160 kg)		Seringue préremplie de 12 000 unités		
	14 000 unités, s.-c., toutes les 24 h (Patients de 161 à 180 kg)		Seringue préremplie de 14 000 unités		
	pour les patients pesant plus de 180 kg		Tinzaparine (innohep®) à 175 unités /kg s.-c., au coucher		
Prophylaxie post-partum	4 500 unités, s.-c., toutes les 24 h		Seringue préremplie de 4 500 unités		Posologie normalisée.
Prophylaxie durant	4 500 unités, s.-c., toutes les 24 h		Seringue préremplie de 4 500 unités		Posologie normalisée.

la grossesse			
Prophylaxie ou traitement de la TEV pour une dose afin de faciliter l'administration aux patients ambulatoires des Centres d'accès aux soins communautaires (CASC)	Aucune substitution	Ne s'applique pas	

* Remarque : On doit calculer individuellement, en fonction du poids corporel, la dose des patients dont le poids ne correspond pas à ces valeurs. Un ajustement posologique plus personnalisé ou le choix d'un autre anticoagulant peuvent être requis et envisagés dans certaines situations cliniques, par exemple pour les patients atteints d'insuffisance rénale grave (clairance de la créatinine inférieure à 20 ml/min). Dans ces circonstances, on doit envisager une consultation en hématologie. En ce qui concerne les doses qui ne sont pas offertes sur le marché, l'infirmière devra éliminer la quantité excédentaire du médicament afin d'atteindre la dose arrondie. Il n'est pas nécessaire d'éliminer la bulle d'azote de la seringue si l'on administre toute la dose contenue dans la seringue, car elle peut être injectée sans risque par voie sous-cutanée. Si elle nuit à la lecture de la dose dans la seringue, la bulle peut être délicatement expulsée, puis l'on peut mesurer la dose à administrer.