

Posologie de la tinzaparine (innohep®) pour le traitement de la TVP et/ou de l'EP

(Posologie : 175 unités/kg de poids corporel, en une injection sous-cutanée par jour
Seringues à doses variables à 20 000 unités/ml*

| Poids corporel du patient (kg) | Dose (UI) | Montant (mL) pour Administrer * |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 31 à 36 | 6 000 | 0,3 |
| 37 à 42 | 7 000 | 0,35 |
| 43 à 48 | 8 000 | 0,4 |
| 49 à 53 | 9 000 | 0,45 |
| 54 à 59 | 10 000 | 0,5 |
| 60 à 65 | 11 000 | 0,55 |
| 66 à 70 | 12 000 | 0,6 |
| 71 à 76 | 13 000 | 0,65 |
| 77 à 82 | 14 000 | 0,7 |
| 83 à 88 | 15 000 | 0,75 |
| 89 à 93 | 16 000 | 0,8 |
| 94 à 99 | 17 000 | 0,85 |
| 100 à 105 | 18 000 | 0,9 |

- Aussi offert en fioles multidoses à 20 000 unités par ml pour les doses supérieures à 18 000 unités (l'utilisation des fioles multidoses n'est pas recommandée chez les femmes enceintes)

Posologie de la tinzaparine (innohep®) pour la prophylaxie de la TVP chez les patients

| Poids corporel du patient (kg) | Dose (UI) | Montant (mL) pour Administrer * |
|--------------------------------|---|---------------------------------|
| < 40 kg | 3 500 units | 0,35 mL |
| 40-100 | 4 500 units | 0,45 mL |
| > 100 kg | Des ajustements posologiques peuvent être nécessaires pour les patients dont le poids corporel est plus élevé | |